Saumon Atlantique

Salmo salar (L., 1758)

Code Natura
1106

Classification

Classe : Poissons
Ordre : Salmoniformes
Famille : Salmonidés

Protection

- Directive Habitats-Faune-Flore : Annexes II et V
- Convention de Berne : Annexe III
- Protection Nationale : Article 1er
- Cotation UICN : France : vulnérable

Etat de conservation sur le site

- Indéterminé

Description

Le Saumon Atlantique est un cousin de la truite. Il mesure de 60 cm à 1,5 mètre de long pour un poids avoisinant les 35 Kg. La coloration de la robe est d'aspect métallique, variable suivant le stade de développement, avec le dos bleu plus ou moins grisé, les flancs argentés et le ventre blanc. Les jeunes saumons, appelés aussi tacons, mesurent moins de 15 cm et ont de grandes tâches sombres et des points rouges sur les flancs. Au moment d'entreprendre leur migration vers la mer, ils prennent une livrée argentée, brillante : ce sont les « smolts » dont la silhouette s'allonge.

Écologie

Le Saumon Atlantique est un poisson migrateur anadrome. C'est-à-dire qu'il vit en mer et se reproduit en rivière. Après sa naissance, le Saumon vit 1 à 2 ans en rivière avant de partir grandir en pleine mer. Il y restera 1 à 4 ans avant de retourner à sa rivière natale pour s'y reproduire. Les frayères sont constituées de plage de galets ou de graviers en eaux peu profondes. La vie des juvéniles se déroule dans des rivières bien oxygénées sur fond de gravier.

Répartition

Le Saumon Atlantique est présent dans la majorité des cours d'eau tempéré de l'Atlantique Nord. Ses aires d'engraissement se situent en mer à l'ouest du Groenland, au nord des îles Féroé et dans la mer de Norvège. En France, l'espèce ne fréquente que les cours d'eau du littoral Atlantique et de la Manche.

Zoom sur la Bretagne et sur le site

En Bretagne, l'espèce est présente sur nombre de cours d'eau. Les données fournies par l'ONEMA et la Fédération de Pêche du Morbihan n'ont pas indiqué une forte présence du Saumon sur le site. Seuls quelques tacons ont été pêchés entre 2001 et 2009. La limite amont de capture étant le « Quenelet » en 2005. Le Saumon Atlantique fraye potentiellement aux mêmes endroits que la Lamproie marine.

Menaces sur le site

- Il est probable que l'une des principales menaces soit les obstacles à la remontée piscicole.
- La dégradation de frayères ou de la qualité de l'eau pourraient aussi avoir un impact sur l'espèce.

Propositions de gestion

- La suppression ou l'aménagement des ouvrages pourraient faciliter la présence du Saumon sur le site.
- La présence de frayères et le maintien d'une eau de bonne qualité favoriseraient aussi l'espèce.