Loutre d'Europe

Lutra lutra (L., 1758)

Code Natura 1355

Classification

Classe : Mammifères
Ordre : Carnivores
Famille : Mustélidés

Protection

- Directive Habitats-Faune-Flore : Annexes II et IV
- Convention de Berne : Annexe II
- Convention de Washington : Annexe I
- Protection Nationale : Article 1er
- Cotation UICN : Monde : menacé d'extinction ; France : en danger

Etat de conservation sur le site

- Site important pour l'espèce
- Conservation : Bonne
- Isolement : Non-isolée
- Globale : Bonne

Description

La Loutre d'Europe est l'un des plus grands Mustélidés d'Europe. Elle mesure en moyenne de 70 à 90 cm pour le corps et de 30 à 45 cm pour la queue, pour un poids moyen de 5 à 12 Kg. De couleur brunâtre à marron foncé, on observe des zones grisâtres plus claires sur la gorge, la poitrine et le ventre. Des petites marques blanches sur la lèvre supérieur, le menton et parfois le cou permettent de distinguer les individus. La Loutre d'Europe possède un corps fuselé, un cou large et conique, une tête aplatie et des membres courts et trapus faisant d'elle une parfaite nageuse.

Écologie

La Loutre est inféodée aux milieux aquatiques dulcicoles, saumâtres et marins. Elle se montre très ubiquiste dans le choix de ses habitats et de ses lieux d'alimentation. En revanche, les milieux réservés aux gîtes diurnes sont choisis en fonction de critères de tranquillité et de couvert végétal. La Loutre est un animal essentiellement nocturne. Durant la journée, elle se repose, enfouie dans un terrier profond ou tapie dans une couche dissimulée dans les ronciers, les fourrés ou les formations d'hélophytes denses.

Répartition

Présente sur la quasi-totalité de l'Eurasie et des pays du Maghreb, à partir des années 30, la Loutre d'Europe s'est tout de même considérablement raréfiée suite à sa chasse et la destruction de ses habitats. La France n'a pas échappé à ce phénomène. Aujourd'hui, les populations recolonisent progressivement certains réseaux hydrographiques même s'il existe toujours un clivage entre les populations atlantique et continentale.

Zoom sur la Bretagne et sur le site

Lors de sa période de déclin, elle s'est maintenue en Bretagne et dans le Massif Central. La recolonisation de la Loutre vers les autres régions françaises passe donc par un maintien en bonne santé des populations déjà existantes.
Depuis quelques années, la présence de la loutre est avérée sur le site de la Vallée de l'Arz. La dernière prospection réalisée en mars 2013 dans le cadre de l'élaboration du DOCOB confirme la présence d'épreintes (excréments) sur l'ensemble du cours de l'Arz et sur quelques affluents de celui-ci.

Menaces sur le site

- La destruction ou la fragmentation de l'habitat présente un risque de déclin de l'espèce.
- La mortalité accidentelle reste aussi l'une des principales menaces. Les collisions routières peuvent être fréquentes si les ouvrages hydrauliques sont mal adaptés.
- La pollution des écosystèmes aquatiques et la raréfaction des peuplements piscicoles pèsent aussi sur l'état des populations.
- Les dérangements dus aux activités nautiques peuvent aussi être une menace.

Propositions de gestion

- Même si aucun cas de collision n'a été observé, une étude sur les ouvrages hydrauliques pourrait être menée afin de déterminer le risque de collision pour chacun d'entre eux.
- Lors de l'entretien de zones humides il faut conserver des zones de refuges constituées de végétation dense (saulaies, ronciers, roselières cariçaies…).
- Pour l'entretien de cours d'eau, il faut préserver les essences avec d'important lacis de racines ou créant des cavités sous berges (chêne, aulne, frêne…). Les rémanents de coupes peuvent aussi être laissés sur place afin de fournir des gîtes et des abris à batraciens qui font partie de l'alimentation de la Loutre.

Localisation des épreintes de loutre d'Europe observées en mars 2013



Légende :

- Réseau hydrographique
- Périmètre du site Natura 2000 FR5300058 - Vallée de l'Arz
- Epreintes de loutre d'Europe observées (prospection du 14 mars 2013)

N
W E
S

0 0.5 1 1.5 2
Kilomètres